n.° 10. Observation sur l'extirpation d'une tumeur enkistée, à la face

Monsieur *** homme de qualité, portoit depuis plusieurs années — une tumeur à la partie lattrale gauche de la face qui occupoit d'un coté, l'angle de la machoire inferieure, toutte la portion moyenne et inferieure du masseter, descendoit sur la baze de la machoire en recouvrant enfin tous les muscles de la joüe. — Cette tumeur génoit tellement l'action de ces muscles, qu'elle devenoit un obstacle à la mastication.

Les fondans tant intérieurement, qu'extérieurement, les tisannes délayantes et apéritives n'étoient qu'un foible secours contre le volume et la dureté de cette éminence contre nature. le malade me demanda des soins et me pria de luy indiquer les moyens de se débarasser d'une maladie qui sans être grandement douloureuse — le défiguroit essentiellement. je luy conseillai l'extirpation. jeune et plein de courage, il s'y décida sur le champ et me pria de choisir le jour de l'opération; il fut purgé le lendemain et le surlendemain je l'opérai de la manière suivante en — présence d'un de mes confrères et du chirurgien major de Royal lorraine en garnison dans cette ville.

je fis pincer (autant qu'il fut possible) les téguments qui recouvroient la tumeur par mes élèves, j'incisai et prolongeai l'incision dans la partie la plus déclive 1.° parceque la tumeur paroissoit adhérente au maxilaire inférieur 2.° pour cacher sous la baze, le désagrément d'une longue cicatrice. mon ouverture bien proportionée au volume, je la débarassai d'entre le tissu cellulaire qui la recouvroit je la saisis avec une érigne pour l'attirer à moy, mais elle étoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 43 n° 10

vetue intérieurement par un nombre prodigieux de filets très durs aux muscles voisins et particulièrement à la machoire inférieure. Lorsqu'elle fut bien dissiquai dans toutte sa circonférence, je la renversai hors de sa cavité, elle ne paroissoit plus attachée qu'a un fort cordon qui répondoit dans son milieu; je le serrai entre le tranchant de mes cizeaux avec force et la tumeur entraina après elle un nombre infinis de petites glandes gorgées mais encore molles. au coup de cizeau, le sang jaillit d'une force singulière, je fis mettre le doigt sur le vaisseau veineux et y apliquay ensuite des morceaux d'agaric que j'avois préparé dans le besoin. je remplis la playe de charpie imbue d'esprit de vin et pardessus des compresses graduées que je soutins avec un bandage suffisamment serré. le malade satisfait de voir l'opération achevée, poussoit des éclats de rire, tandisque ses parents pleuroient ses maux passés. je le fis saigner deux fois du même jour, avec le soin de ne luy donner du bouillon qu'au moyen d'une cüillère à bec; je luy interdis la parole, le rire, la toux et l'eternuement autant qu'il seroit en son pouvoir de captiver l'un et l'autre. deux fois vingt quatre heures après, je levai l'appareil avec toutte la circonspection possible. la suppuration detatsa l'agaric sans accident. le digestif le plus simple et la charpie sèche m'ont suffis pour conduire la playe à cicatrice qui a été parfaittement formée dans l'espace de dix sept jours.

La cure n'auroit pas été aussy longue à beaucoup près sans l'hemmoragie qui me contraignit de comprimer le fond de la playe et les bords. je me serois contenté de les raprocher avec quelques emplatres aglutinatifs.

La tumeur en elle même mérite un petit détail, elle ne tenoit

de la nature d'une loupe de quelle espèce que ce soit, quoiqu'elle fut enkistée, sa dureté résistoit à l'instrument le plus tranchant, son envelope étoit épaisse d'une ligne, son poid ~~étoit~~ de quatre onces un gros et demy, elle étoit aplatie du coté des muscles et arrondie sous les tégumens; elle étoit percée dans son milieu d'un trou rond et fort unis, de la capacité d'un tuyau de plume a écrire et à coté en étoit un autre d'une bien moindre capacité. les trous répondoient à un cordon dur qui s'attachoit à la face interne de la baze de la machoire inférieure fort étroittement au point que le maxillaire resta découvert dans cet endroit et n'empêcha ~~[illegible]~~ pas la playe de se cicatriser dans les dise sept jours. à la face interne de cette masse charnüe, en étoient attachées deux autres dont le volume égaloit de grosses fèves et dans les intervalles etoit une quantité de petits grains glanduleux distinctement séparés les uns des autres par un tissu cellulaire très fort. si l'on veut se faire une idée parfaitte de cette tumeur, on peut la comparer à un placenta pour la rondeur la forme et le cordon. les vaisseaux du kiste se trouvèrent également engorgés et variqueux.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

il y a tout lieu de croire que cette tumeur a commencé par l'engorgement d'une des glandes bucales du nombre de celles qui rampent sur le muscle buccinateur, car c'est dans cette endroit qu'elle marquoit plus d'adhérence; que la cause de son engorgement à été l'effet d'un suc épais acre et mordant qui a resserré les filtres excrétoires, que par une succession de tems elle a acquis un volume considérable, que le filet sanguin qui l'abreuvoit a suivis les mêmes [degrés] d'accroissement, que la pression qu'elle faisoit

Sur les Glandes voisines ou retardoit egalement l'excretion et qu'elles auroient acquis un volume considerable. il n'y a aucun doutte qu'il auroit été d'une difficulté extrême de résoudre cette masse, comme de la changer en pus, que l'une et l'autre tentation pouvoient avoir des suittes dangereuses pour l'avenir, et qu'enfin la cure ne pouvoit ceder qu'a L'extirpation

a Dole 16 xbre 1772

Lombard
chirurgien

f. Comté